

云南省中职职教高考职业技能 考试说明（试行）

10 护理类

一、考试性质和目的

职业技能考试是中职职教高考的重要组成部分。护理类职业技能考试依据教育部《中等职业学校专业教学标准（试行）》组织实施，是面向报考护理类专业考生的专业素质测试。

护理类职业技能考试分为专业理论测试和专业技能测试两个科目。主要考查考生护理类基础理论知识、基本操作技能和职业素养，评价考生进入高等职业院校相关专业学习的基本素质和基本能力，评价结果作为高等职业院校招生录取的重要依据。

二、考试科目和分值

护理类职业技能考试总分400分，包括专业理论测试、专业技能测试两个科目。

（一）科目一：专业理论测试

满分200分，考试时间90分钟，采用闭卷纸质考试形式。考试内容为解剖学基础知识、基础护理知识。题型包括单项选择题、A1型选择题、A2型选择题共3种题型。考试内容、题型、题量、分值情况见下表。

考试内容	题型	题量	分值		总分
解剖学基础知识	单项选择题	50	100	100	200
基础护理知识	A1型选择题	20	40	100	
	A2型选择题	20	60		

（二）科目二：专业技能测试

满分200分，考试时间10分钟，采用现场实操。

三、考试形式和内容

（一）专业理论测试

考试形式为闭卷考试，纸质试卷、答题卡答题。全省统一组织命题、制卷、考试和评卷。专业理论测试考试内容包括解剖学基础知识和基础护理知识两个模块，解剖学基础知识涵盖系统解剖学的基本理论、知识和技能；基础护理知识涵盖基础护理学的基本理论、知识和技能，具体考试内容如下。

1. 解剖学基础知识。

（1）绪论：解剖学姿势、方位、轴和面。

（2）骨学：骨的形态分类；椎骨、胸骨、肋骨；脑颅骨、面颅骨、颅整体观（顶面观、侧面观、颅底内面观）；肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨；髌骨、股骨、胫骨、腓骨。

（3）关节学：关节的基本结构和分类；脊柱、胸廓；肩关节、肘关节、腕关节；骨盆、髋关节、膝关节、踝关节。

（4）肌学：肌的形态分类；咀嚼肌名称；颈肌的分群；斜方肌、背阔肌、竖脊肌；胸上肢肌、胸固有肌；膈的裂孔与通过结构；腹肌的分群；上肢带肌、臂肌、前臂肌；髋肌、大腿肌和

小腿肌的分群，臀大肌、股四头肌、缝匠肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、小腿三头肌。

（5）消化系统：上、下消化道；咽峡、舌乳头、大唾液腺；咽的分部；食管分部与狭窄；胃的位置、形态与分部；小肠分部与特点；盲肠和结肠的特征性结构、回盲部通连关系、麦氏点、结肠分部、肛管内面观结构；肝的位置形态、第一肝门与肝蒂、肝外胆道系统；胰的分部。

（6）呼吸系统：上、下呼吸道；鼻甲与鼻道、鼻旁窦；喉软骨、喉腔；气管与主支气管、气管隆嵴；肺的形态与分叶、肺尖位置、肺门与肺根、支气管树；胸膜腔特点、壁胸膜分部、肋膈隐窝；纵隔四分法依据。

（7）泌尿系统：肾的形态和位置、肾门与肾蒂、肾被膜、肾的剖面结构；输尿管分部与狭窄；膀胱位置与分部、膀胱三角；女性尿道特点。

（8）男性生殖系统：内生殖器组成；睾丸的位置形态、附睾通连关系、输精管分部、精索的构成、射精管开口、精囊和前列腺位置；男性尿道分部、狭窄与弯曲。

（9）女性生殖系统：内生殖器各部功能；卵巢的位置与形态；输卵管分部与通连关系；子宫外形与内腔分部、位置与固定装置、韧带名称及其作用；阴道连接关系、阴道后穹。

（10）腹膜：腹膜与腹膜腔特点；腹膜与腹盆腔脏器的关系；网膜、系膜、肝肾隐窝、直肠膀胱陷凹、直肠子宫陷凹。

（11）心血管系统：体循环和肺循环的起止；心脏的位置、外形、心腔、构造、传导系统、血管和心包；主动脉各部一级分支、颈外动脉分支、腹腔干分支、肠系膜上动脉分支、分布于胃的动脉、上下肢动脉主干及主要分支；奇静脉及其属支、静脉

角、颈内静脉及其属支、下腔静脉主要属支、颈部和上下肢浅静脉，肝门静脉的组成、属支与门腔吻合途径。

（12）淋巴系统：淋巴系统组成概况；胸导管起止与收纳范围；脾的位置形态、脾切迹。

（13）视器：眼球壁的组成、视神经盘与黄斑、眼球内容物、房水循环途径、眼的屈光系统、近视和远视基本因素；眼副器组成、泪道交通关系、眼球外肌名称及作用。

（14）前庭蜗器：外耳道分部；中耳各部通连关系；鼓室六个壁特殊名称、前庭窗与蜗窗、幼儿咽鼓管特点；骨迷路和膜迷路的组成，内耳位、听觉感受器的名称。

（15）神经系统总论：常用术语的区分。

（16）中枢神经系统：脊髓的位置与外形、节段划分、内部结构概况；脑干的组成、外形与灰质区分、四大丘系名称与传导信息；小脑的位置与外形；背侧丘脑和下丘脑的组成与中枢地位；端脑外形与分叶、大脑皮质机能定位、基底核的组成、大脑髓质纤维类型、内囊位置与分部；第四脑室、第三脑室、侧脑室的位置与交通关系。

（17）周围神经系统：脊神经的组成与性质；颈丛、臂丛、腰丛、骶丛的主要分支与分布；胸神经前支分布规律；常见脊神经损伤与典型表现；脑神经的顺序名称、连脑、进出颅部位与性质分类；运动性和混合性脑神经分布概况；内脏神经分布范围；交感神经和副交感神经低级中枢部位。

（18）神经传导通路：锥体系的组成与损伤表现。

（19）中枢附属结构：脑和脊髓的被膜层次；硬膜外隙、蛛网膜下隙的位置与特点；硬脑膜形成结构；脑的供血来源、大脑动脉环的位置；脑脊液产生及循环途径。

（20）内分泌系统：内分泌系统组成概况；甲状腺、肾上腺、垂体的位置形态与功能。

2. 基础护理知识。

包括一般生活护理技能、与诊疗相关的护理技术、配合抢救技术、临终护理，以及护理文件的书写等基础内容，具体考试内容如下。

（1）医院与住院环境：各种铺床法的目的、操作步骤、注意事项，并区别其不同点。

（2）医院感染的预防和控制：无菌技术（无菌持物钳的使用、无菌容器的使用、无菌包的使用、取用无菌溶液、铺无菌盘、戴无菌手套）的操作目的、操作步骤、注意事项；隔离技术基本操作，包括穿脱隔离衣的目的、操作步骤、注意事项。

（3）入院和出院护理：各种运送法（轮椅运送法、平车运送法、担架运送法）的目的、操作步骤、注意事项。

（4）卧位与安全的护理：各种卧位（仰卧位、侧卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、膝胸卧位、截石位）的适用范围和卧姿安置要求；协助病人更换卧位（协助病人翻身、协助病人移向床头）的操作步骤、注意事项；保护具使用技术的操作步骤、注意事项。

（5）生命体征的评估及护理：体温测量法的准备、操作步骤、注意事项，区分口温、肛温和腋温的测量方法；脉搏测量法的准备、操作步骤、注意事项；呼吸测量法的准备、操作步骤、注意事项；血压测量法的准备、操作步骤、注意事项。

（6）清洁护理：口腔护理的目的、常用漱口液及其作用、操作步骤、注意事项，昏迷病人的口腔护理；卧床病人更换床单法的操作目的、操作步骤、注意事项；床上擦浴技术的操作目

的、擦浴水温、室温、操作步骤、注意事项。

（7）饮食护理：鼻饲技术的目的、鼻饲液温度、插管长度、确认胃管到达胃内的方法、操作注意事项。

（8）排泄护理：导尿术、留置导尿术、灌肠术及肛管排气技术的目的、操作步骤及注意事项。

（9）冷热疗技术：常用的冷疗技术（乙醇、温水拭浴）和热疗技术（热水袋的使用、湿热敷）的操作步骤及注意事项。

（10）药物疗法：口服给药技术的目的、操作步骤、注意事项；氧气雾化吸入技术的目的、操作步骤、注意事项；药液抽吸技术的操作步骤、注意事项；注射技术（皮内注射、皮下注射、肌肉注射、静脉注射、动脉注射）的目的、操作步骤、注意事项，并区别其不同点；青霉素过敏试验法的操作目的、操作步骤、试验结果判断、注意事项和皮试液的配制方法。

（11）静脉输液与输血：静脉输液的目的、操作步骤、注意事项；静脉输血的目的、操作步骤、注意事项。

（12）标本采集：各种标本采集技术（血标本、尿标本、粪便标本、痰标本、咽拭子标本）的目的、操作步骤、注意事项。

（13）危重病人的护理及抢救技术：吸痰技术、洗胃技术、氧气吸入技术、简易呼吸器使用技术的目的、操作步骤、注意事项。

（14）临终关怀及临终护理：尸体护理技术（安置体位、清洁面部，整理遗容、填塞孔道、清洁全身、包裹尸体）、注意事项。

（15）医疗与护理文件：常用护理相关的文件记录（体温单、医嘱单、出入液量的记录、护理记录单、病室报告单、护理病历）的书写目的、记录方法、要求、注意事项。

（二）专业技能测试

考试内容：皮下注射法

考核资源：治疗车、治疗盘、无菌治疗巾、无菌持物镊及干燥容器、注射器和针头、皮下注射模型、皮肤消毒液、无菌棉签、手消毒液、无菌纱布、锐器收集盒、生活垃圾桶、医疗垃圾桶、砂轮、启瓶器、注射卡、弯盘、表、笔、药液。

皮下注射操作评价标准

项 目		分值	技能操作要求	评分等级			
				I	II	III	IV
自身准备		18	（1）着装整洁	4	2	1	0
			（2）仪表、举止、语言得体，态度合适	8	6	4	2
			（3）核对（两人）医嘱、注射卡、药物准确	6	4	2	0
评估		14	（1）核对、解释	4	2	1	0
			（2）病人（评估病情、身心状态、配合程度，用药史、过敏史，注射部位皮肤情况）	10	8	6	4
操作前准备	环境	4	（1）环境整洁、安静、安全、明亮、温湿度适宜、必要时用屏风遮挡	2	1	0.5	0
			（2）盘、台、车清洁	2	1	0.5	0
	护士	4	七步洗手法洗手、戴口罩	4	2	1	0
	用物	6	用物备齐，摆放有序，符合行业标准（清洁治疗盘、无菌治疗巾、无菌持物镊及干燥容器、无菌纱布、1~2mL注射器2具、皮下注射模型、皮肤消毒液、无菌棉签、手消毒液、锐器回收盒、砂轮、注射卡、弯盘、表、笔、按医嘱备药）	6	4	2	0
	抽吸药液	22	（1）铺无菌盘无污染	4	2	1	0
			（2）药液抽取方法正确	8	6	4	1

续表

项 目		分值	技能操作要求	评分等级			
				I	II	III	IV
			(3) 药液不残余、不漏、不污染	4	2	1	0
			(4) 排气(方法正确,不浪费药液)	4	2	1	0
			(5) 将配好的药液置于无菌盘内	2	1	0.5	0
操作过程	核对解释	6	再次核对,解释(向病人解释,说明目的、方法及配合要点,协助病人取舒适卧位,询问病人的需求并帮助解决)	6	4	2	0
	环境	2	安静、整洁、光线适宜	2	1	0.5	0
	病人准备	14	(1) 病人体位舒适	4	2	1	0
			(2) 注射部位选择(选择正确的注射部位)	4	2	1	0
			(3) 消毒:常规消毒注射部位皮肤,消毒范围直径 $\geq 5\text{cm}$ 、待干	6	4	2	0
操作过程	注射	70	(1) 打开治疗盘,取出注射器,再次排空气(不浪费药液),拧紧针头	6	4	2	0
			(2) 再次核对准确	4	2	1	0
			(3) 穿刺:左手绷紧注射部位皮肤,右手持注射器,示指固定针栓,针头斜面向上与皮肤呈 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$,快速刺入皮下,针梗刺入 $1/2 \sim 2/3$	24	18	12	6
			(4) 注射:一只手固定针栓,另一只手抽动活塞,无回血后可缓慢推注药液	22	16	10	4
			(5) 拔针:用无菌干棉签轻压针刺处,快速拔针后按压至不出血为止(拔针手法正确,棉签按压准确)	8	6	4	2
			(6) 再次核对、观察病人反应	6	4	2	0

续表

项 目	分值	技能操作要求	评分等级			
			I	II	III	IV
操作后	20	(1) 协助病人取舒适卧位	4	2	1	0
		(2) 分类处理用物	4	2	1	0
		(3) 七步洗手法洗手, 摘口罩	4	2	1	0
		(4) 记录(注射时间并签全名, 病人反应)	4	2	1	0
		(5) 向病人交代注射药物后的注意事项	4	2	1	0
评价	20	(1) 质量标准: 一次注射成功, 注射剂量准确; 严格执行查对制度和无菌技术操作	5	4	3	2
		(2) 熟练程度: 程序正确, 操作规范, 动作熟练	5	4	3	2
		(3) 人文关怀: 关爱病人, 沟通有效, 体现人文关怀	5	4	3	2
		(4) 操作时间: 操作时间<10分钟	5	4	3	2
关键缺陷		无人文关怀、无沟通、无安全意识、查对不严、发生事故、严重污染者为不及格				
总分	200分					

注: 评分等级为 I 级表示熟练、规范、无缺项, 与病人沟通自然, 语言通俗易懂, 合作优异; II 级表示操作欠熟练、规范, 有1—2处缺项, 与病人沟通欠自然, 合作良好; III 级表示欠熟练、规范, 有1—2处缺项, 与病人沟通较少, 无主动合作; IV 级表示操作不熟练, 有3—4处或以上缺项, 与病人无沟通, 无合作。

四、试题示例

第一部分

护理类专业理论测试样题

(满分200, 考试时间90分钟)

一、单项选择题(本题共50小题, 每小题2分, 共100分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求)

1. 仰卧位时腹面和背面属于()。
A. 上下关系 B. 前后关系 C. 浅深关系 D. 内外关系
2. 胸骨角两侧平对()。
A. 第2肋软骨 B. 第2肋间隙 C. 第3肋软骨 D. 第3肋间隙
3. 棘突宽平呈板状的是()。
A. 下位颈椎 B. 上位胸椎 C. 下位胸椎 D. 下位腰椎
4. 肱骨近端结构包括()。
A. 尺神经沟 B. 桡神经沟 C. 结节间沟 D. 肱骨小头
5. 属于关节面的是()。
A. 下颌窝 B. 鹰嘴窝 C. 髌臼窝 D. 髌间窝
6. 属于多轴关节的是()。
A. 椭圆关节 B. 滑车关节 C. 球窝关节 D. 鞍状关节
7. 参与构成椎管后壁的是()。
A. 棘间韧带 B. 后纵韧带 C. 黄韧带 D. 项韧带
8. 女性耻骨下角约()。
A. $90^{\circ} \sim 100^{\circ}$ B. $80^{\circ} \sim 100^{\circ}$ C. $75^{\circ} \sim 90^{\circ}$ D. $70^{\circ} \sim 75^{\circ}$
9. 不属于表情肌的是()。
A. 枕额肌 B. 颧大肌 C. 二腹肌 D. 耳后肌
10. 瘫痪可导致耸肩障碍的是()。
A. 菱形肌 B. 斜方肌 C. 冈上肌 D. 三角肌
11. 与肱肌同群的是()。

- A. 肱三头肌 B. 旋前圆肌 C. 喙肱肌 D. 肱桡肌
12. 不参与围成咽峡的是()。
- A. 两侧腭舌弓 B. 两侧腭咽弓 C. 腭帆游离缘 D. 腭垂与舌根
13. 属于喉咽部的是()。
- A. 扁桃体窝 B. 梨状隐窝 C. 会厌谷 D. 咽隐窝
14. 胃小弯最低处为()。
- A. 幽门管 B. 幽门窦 C. 角切迹 D. 中间沟
15. 肠脂垂分布于()。
- A. 结肠带两侧 B. 结肠袋之间 C. 空回肠表面 D. 回盲部表面
16. 肝蒂内容不包括()。
- A. 肝固有动脉 B. 肝左右管 C. 肝小静脉 D. 肝门静脉
17. 鼻旁窦开口正确的是()。
- A. 前筛窦开口于下鼻道 B. 后筛窦开口于上鼻道
C. 额窦开口于蝶筛隐窝 D. 蝶窦开口于半月裂孔
18. 炎症时易发生水肿的是()。
- A. 喉中间腔 B. 声门下腔 C. 喉腔上部 D. 喉口周围
19. 纵隔四分法以()为界。
- A. 胸骨角 B. 心包腔 C. 气管杈 D. 肋间隙
20. 属于肾皮质的是()。
- A. 肾锥体 B. 肾乳头 C. 乳头孔 D. 肾柱
21. 输尿管中狭窄位于()。
- A. 腹后壁跨睾丸血管处 B. 骨盆上口跨髂血管处
C. 盆侧壁跨闭孔血管处 D. 膀胱后方跨输精管处
22. 不属于输精管道的是()。
- A. 精曲小管 B. 附睾管 C. 输精管 D. 射精管
23. 男性尿道的特点不包括()。
- A. 可分为三部 B. 有三处扩大 C. 有两个弯曲 D. 无明显狭窄
24. 妊娠期“子宫下段”来源于()。

- A. 子宫颈 B. 子宫峡 C. 子宫体 D. 子宫角
25. 女性外生殖器不包括()。
- A. 大阴唇 B. 小阴唇 C. 会阴体 D. 前庭球
26. 连于肠系膜的是()。
- A. 空肠和回肠 B. 盲肠和阑尾 C. 小肠全段 D. 结肠中段
27. 仰卧时腹膜腔最低部位是()。
- A. 脾肾隐窝 B. 肝肾隐窝 C. 胃脾隐窝 D. 左右髂窝
28. 心腔最靠前的部分是()。
- A. 左心房 B. 左心室 C. 右心房 D. 右心室
29. 测量血压时听诊动脉是()。
- A. 腋动脉 B. 肱动脉 C. 尺动脉 D. 桡动脉
30. 下肢动脉主干是()。
- A. 髂外动脉 B. 股深动脉 C. 髂腰动脉 D. 股动脉
31. 颈内静脉续于()。
- A. 乙状窦 B. 海绵窦 C. 岩上窦 D. 岩下窦
32. 肝门静脉属支不包括()。
- A. 胃左静脉 B. 胃右静脉 C. 膈下静脉 D. 附脐静脉
33. 不注入胸导管的是()。
- A. 左腰干 B. 右腰干 C. 左颈干 D. 右颈干
34. 脾肿大时的触诊依据为()。
- A. 左肋弓 B. 脾长轴 C. 脾质地 D. 脾切迹
35. 产生房水的结构是()。
- A. 睫状小带 B. 虹膜血管 C. 睫状肌 D. 睫状突
36. 对视网膜起支撑作用的是()。
- A. 睫状体 B. 晶状体 C. 玻璃体 D. 眶脂体
37. 上斜肌收缩使瞳孔转向()。
- A. 上内方 B. 上外方 C. 下内方 D. 下外方
38. 鼓室下壁又称()。

- A. 颈动脉壁 B. 颈静脉壁 C. 乳突壁 D. 迷路壁
39. 封闭蜗窗的是 ()。
- A. 第二鼓膜 B. 鼓膜张肌 C. 镫骨底 D. 镫骨肌
40. 内耳平衡器不包括 ()。
- A. 椭圆囊斑 B. 球囊斑 C. 螺旋器 D. 壶腹嵴
41. 灰质存在形式有 ()。
- A. 神经核 B. 神经节 C. 小脑体 D. 大脑回
42. 延髓和脑桥共同形成 ()。
- A. 菱形窝 B. 脚间窝 C. 蓝斑区 D. 最后区
43. 皮质下高级内脏中枢是 ()。
- A. 上丘脑 B. 下丘脑 C. 底丘脑 D. 后丘脑
44. 大脑皮质听觉区位于 ()。
- A. 颞上回 B. 颞中回 C. 颞横回 D. 缘上回
45. 臂丛分支不包括 ()。
- A. 桡神经 B. 膈神经 C. 尺神经 D. 腋神经
46. 尺神经损伤的典型表现是 ()。
- A. “扳机手” B. “垂腕手” C. “枪刺刀” D. “爪形手”
47. 第Ⅸ对脑神经是 ()。
- A. 舌咽神经 B. 舌下神经 C. 迷走神经 D. 副神经
48. 硬膜外隙不含 ()。
- A. 齿状韧带 B. 脊神经根 C. 蜂窝组织 D. 淋巴管
49. 不属于硬脑膜的是 ()。
- A. 大脑镰 B. 小脑幕 C. 小脑镰 D. 透明隔
50. 基底动脉来源于 ()。
- A. 脊髓动脉 B. 延髓动脉 C. 枕动脉 D. 椎动脉

二、A1型选择题 (本题共20小题, 每小题2分, 共40分。在每小题给出的五个选项中, 只有一项符合题目要求)

1. 被套式备用床枕头放置的正确方法为 ()。

- A. 枕套开口背门，横立于床头
 - B. 枕套开口朝向门，横立于床头
 - C. 枕套开口背门，平放于床头
 - D. 枕套开口朝向门，平放于床头
 - E. 横立于床头
2. 为了保证病人间有适当的空间，医院病床之间的距离不得少于（ ）。
- A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m E. 3m
3. 无菌持物钳的使用方法，错误的是（ ）。
- A. 无菌持物钳的钳端始终向下
 - B. 无菌持物钳的钳端不可触及容器口的边缘
 - C. 无菌持物钳的钳端应保持在胸腹部水平
 - D. 无菌持物钳只能夹取无菌物品
 - E. 无菌持物钳可用于伤口换药
4. 无菌溶液一次未使用完，其有效期为（ ）。
- A. 4小时 B. 24小时 C. 3天 D. 7天 E. 14天
5. 无菌容器的使用方法，错误的是（ ）。
- A. 疑有污染或已被污染时，应更换或重新灭菌
 - B. 用无菌持物钳从无菌容器内夹取无菌物品
 - C. 取出的无菌物品若未使用不可放回容器内
 - D. 取物时，打开容器盖内面向下置于稳妥处
 - E. 手不能触及盖的边缘
6. 鼻饲液的量和温度，正确的是（ ）。
- A. 每次100mL，温度37℃～42℃
 - B. 每次100mL，温度38℃～40℃
 - C. 每次200mL，温度37℃～42℃
 - D. 每次200mL，温度38℃～40℃
 - E. 每次300mL，温度37℃～42℃
7. 尿潴留病人首次导尿放出的尿量不应超过（ ）。

- A. 500mL B. 800mL C. 1000mL D. 1500mL E. 2000mL
8. 行导尿术时，润滑导尿管用的是（ ）。
- A. 无菌生理盐水 B. 无菌蒸馏水
C. 无菌凡士林 D. 无菌液状石蜡油
E. 无菌碘伏溶液
9. 给男病人导尿时为便于插管，护士应提起阴茎与腹壁呈60°角使（ ）。
- A. 尿道膜部扩张 B. 耻骨前弯扩大
C. 耻骨下弯扩大 D. 耻骨前弯消失
E. 耻骨下弯消失
10. 为全麻未清醒病人用热水袋时，水温不应超过（ ）。
- A. 40℃ B. 50℃ C. 60℃ D. 70℃ E. 80℃
11. 胸腹部禁用冷的原因是（ ）。
- A. 体温骤降 B. 心动过速 C. 呼吸节律异常
D. 反射性心率减慢及腹泻 E. 微循环障碍
12. 同时抽取多项血标本时，应将血液最先注入（ ）。
- A. 抗凝管 B. 血培养试管
C. 干燥试管 D. 普通清洁试管
E. 以上均可
13. 因敌百虫农药中毒急送医院，护士为其洗胃。禁用的洗胃溶液是（ ）。
- A. 2%~4%碳酸氢钠溶液
B. 1:5000~1:20000高锰酸钾溶液 C. 5%醋酸
D. 温开水或生理盐水 E. 蛋清液
14. 摆放药物的方法，错误的是（ ）。
- A. 一位病人的药摆好后，再摆下一位
B. 先备固体药，再备水剂与油剂
C. 药液不足1mL用滴管取
D. 两种药液可同置于一药杯内

- E. 油剂应倒入少量冷开水于药杯中
15. 易风化潮解的药物应放在()。
- A. 有色瓶内 B. 阴凉干燥处 C. 密封瓶内
D. 避光纸盒内 E. 冰箱内
16. 病人留置针输液毕进行拔针, 拔针后嘱病人按压()。
- A. 3分钟 B. 4分钟 C. 5~10分钟
D. 12分钟 E. 15分钟
17. 发生溶血反应时, 应立即采取的护理措施是()。
- A. 测量血压、脉搏、呼吸
B. 停止输血, 保留余血
C. 通知医生和血库值班人员
D. 双侧肾区热敷
E. 静脉滴注5%碳酸氢钠
18. 对需要静脉输液的成年人, 使用头皮针进行静脉穿刺时, 优先选择的血管是()。
- A. 贵要静脉 B. 头静脉
C. 桡静脉 D. 手背静脉网
E. 肘正中静脉
19. 遵医嘱行灌肠降温时, 应选用的灌肠液是()。
- A. 4℃生理盐水500mL~1000mL
B. 28℃~32℃生理盐水200mL
C. 39℃~41℃肥皂水200mL
D. 28℃~32℃生理盐水500mL~1000mL
E. 39℃~41℃肥皂水500mL~1000mL
20. 病人吸氧时氧流量为2L/min, 其氧浓度是()。
- A. 21% B. 25% C. 29% D. 33% E. 37%

三、A2型选择题（本题共20小题，每小题3分，共60分。在每小题给出的五个选项中，只有一项符合题目要求）

1. 病人，男，77岁。因脑出血入院，大小便失禁，需加铺橡胶单及中单，其上端距床头约（ ）。
A. 35cm~39cm B. 40cm~44cm C. 45cm~50cm
D. 51cm~53cm E. 55cm~57cm
2. 病人，女，58岁。需行留置导尿术，护士在戴无菌手套时，下列注意事项中，错误的是（ ）。
A. 手套外面为无菌区，应保持无菌
B. 戴好手套的手不可接触手套的内面
C. 未戴手套的手可触及手套的外面
D. 发现手套破损应立即更换
E. 不可强拉手套边缘，以免破损
3. 病人，女，23岁。诊断为“甲型肝炎”收住入院。护士护理病人穿过的隔离衣，被视为清洁部位的是（ ）。
A. 胸前 B. 领口 C. 背部 D. 袖子 E. 腰带以下
4. 病人，男，49岁。因腰椎骨折入院治疗。进行X线片检查时，需搬运至平车上，宜选用的搬运方法是（ ）。
A. 一人法 B. 二人法 C. 三人法 D. 四人法 E. 挪动法
5. 孕妇，28周，为纠正胎位不正应采取何种卧位（ ）。
A. 屈膝仰卧位 B. 截石位
C. 头高足低位 D. 胸膝卧位 E. 端坐位
6. 病人，男，42岁。因颈椎损伤入院，为协助病人变换体位和预防并发症，应采用何种翻身法（ ）。
A. 病人自主翻身法
B. 一人协助病人翻身法
C. 两人协助病人轴线翻身法
D. 三人协助病人轴线翻身法
E. 四人协助病人翻身法

7. 病人，男，67岁。测量口温时不慎将水银体温计咬碎，护士应立即采取的措施为（ ）。
- A. 催吐 B. 口服蛋清液
C. 服缓泻剂 D. 洗胃
E. 清除口腔内玻璃碎屑
8. 病人王某，40岁。因肝癌晚期入院治疗，入院后出现肝昏迷，躁动不安。为保证病人的安全，遵医嘱使用约束带。下列选项中，措施错误的是（ ）。
- A. 被约束的部位应放衬垫
B. 约束带的松紧要适宜
C. 每3小时观察约束部位的血液循环
D. 定时按摩局部以促进血液循环
E. 记录使用约束带的原因、时间、观察结果、护理措施和停止使用的时间
9. 病人，男，72岁。急性阑尾炎术后一天，有活动性义齿，护士拟对其进行口腔护理，下列操作中正确的是（ ）。
- A. 为了使病人保持舒适，卧位时头部可随意摆放
B. 使用0.02%的呋喃西林溶液给病人漱口，可以用于预防铜绿假单胞菌感染
C. 为了方便，可以不取下义齿，直接在口腔中对义齿进行擦洗
D. 操作时每次只能夹取一个棉球，防止棉球遗漏在口腔内
E. 病人的义齿可放入酒精中浸泡，避免滋生细菌
10. 新生儿出生15小时，接种卡介苗正确部位和方法是（ ）。
- A. 前臂掌侧下段（ID） B. 上臂三角肌下缘（ID）
C. 上臂三角肌下缘（H） D. 股外侧（H）
E. 臀大肌（IM）
11. 病人江某，女，65岁。因慢性充血性心力衰竭入院。医嘱：地高辛片0.25mg（1片），po，qd。执行医嘱时应特别注意（ ）。

- A. 嘱病人多饮水
B. 药物研碎、溶解后喂服
C. 给药前测量脉率及脉律
D. 待病人服下后再离开
E. 给药前测量体温
12. 病人，男，70岁。有慢性支气管炎病史，最近咳嗽加剧，痰液黏稠，伴呼吸困难。入院后给予氧气雾化吸入，护士操作时错误的一项是（ ）。
- A. 核对病人、做好解释
B. 遵医嘱添加药液
C. 湿化瓶内加入蒸馏水
D. 教会病人做深吸气
E. 远离火源
13. 病人，男，25岁。因手术后输血出现皮肤瘙痒、眼睑、口唇水肿，应考虑为（ ）。
- A. 过敏反应
B. 枸橼酸钠中毒反应
C. 细菌污染
D. 溶血反应
E. 发热反应
14. 病人唐某，女，75岁。因中风偏瘫入住康复科，护士静脉注射血塞通注射液时病人表示注射部位疼痛，此时护士看到注射部位肿胀，回抽有回血，应考虑为（ ）。
- A. 针头阻塞
B. 针头未进入血管
C. 针尖斜面部分在血管内
D. 针头穿透对侧血管壁
E. 静脉痉挛
15. 病人蒋某的青霉素皮试结果表现为局部有痒感，皮丘红肿，直径1.3cm，目前暂时无其他不适。下列选项中，处理正确的是（ ）。
- A. 可以注射青霉素
B. 可以注射青霉素，但需将剂量减半
C. 暂停使用青霉素，下次使用前重新做皮试
D. 禁用青霉素，并及时报告医生
E. 做对照试验

16. 病人张某，男，48岁。因急性牙周炎入院，医嘱要求使用青霉素治疗。护士实施青霉素过敏试验，操作正确的是（ ）。
- A. 用碘酊消毒皮肤
B. 注射部位：前臂掌侧下段
C. 进针角度：10°角
D. 药液推至真皮组织
E. 拔针后用无菌干棉签按压
17. 病人王某，突发严重低血糖。医嘱：50%葡萄糖40mL静脉注射，护士立即执行。护士从安瓿内抽吸药液时，做法错误的是（ ）。
- A. 针尖斜面向上
B. 注射器刻度面向上
C. 消毒安瓿
D. 排尽空气
E. 安瓿顶端药液弹至体部
18. 病人，女，27岁。因异位妊娠破裂后急需输入400mL血液，输完一袋血液，再输入另一袋血液之前应滴注（ ）。
- A. 0.9%生理盐水
B. 5%葡萄糖
C. 复方氯化钠
D. 平衡液
E. 5%葡萄糖盐水
19. 病人，女，25岁。近日晨起恶心呕吐，月经停止，疑为早孕，为确诊需采集尿标本，护士指导病人需何时留取尿标本（ ）。
- A. 饭后两小时
B. 晨起第一次尿
C. 12小时尿
D. 48小时尿
E. 随时收集尿液
20. 病人，男，67岁。因冠心病入院。在静脉输液的过程中出现了胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰。该病人发生了（ ）。
- A. 发热反应
B. 急性肺水肿
C. 静脉炎
D. 空气栓塞
E. 过敏反应

第二部分
护理类专业技能测试样题
(满分200分, 考试时间10分钟)

样题1

操作考试情境: 高某, 男, 43岁, 诊断为缺血性脑血管病, 现需要注射低分子肝素钙。

医嘱为: 低分子肝素钙注射液0.4mL: 4000IU H st

样题2

操作考试情境: 李某, 男, 65岁, 胰腺炎术后, 现需要注射醋酸奥曲肽注射液。

医嘱为: 醋酸奥曲肽注射剂1mL: 0.1mg H st

样题3

操作考试情境: 张某, 男, 18个月, 现需要在社区卫生服务中心接种麻腮风疫苗。

医嘱为: 麻疹腮腺炎风疹联合减毒活疫苗注射剂0.5mL H st

样题4

操作考试情境: 李某, 女, 18岁, 现需要在社区卫生服务中心接种风疹减毒活疫苗。

医嘱为: 风疹减毒活疫苗0.5mL H st

样题5

操作考试情境: 兰某, 女, 2岁, 现需要在社区卫生服务中心接种乙脑减毒活疫苗。

医嘱为: 乙脑减毒活疫苗0.5mL H st

样题6

操作考试情境：田某，女，18个月，现需要在社区卫生服务中心接种甲肝疫苗。

医嘱为：冻干甲型肝炎减毒活疫苗注射剂1mL H st

样题7

操作考试情境：钱某，女，9个月，现需要在社区卫生服务中心接种A群流脑多糖疫苗。

医嘱为：A 群流脑多糖疫苗0.5mL H st

样题8

操作考试情境：王某，男，20岁，现需要在社区卫生服务中心接种水痘疫苗。

医嘱为：水痘减毒活疫苗0.5mL H st

样题9

操作考试情境：张某，男，70岁，因胸闷收治入院，入院后予以行冠状动脉造影术，伤口位于左侧桡动脉，并以弹力绷带加压包扎，现需要注射低分子肝素。

医嘱为：低分子肝素钠注射液0.4mL：4250IU H st

样题10

操作考试情境：陈某，女，6岁，需要在社区卫生服务中心接种A+C流脑疫苗。

医嘱为：A群C群流脑多糖疫苗0.5mL H st

五、参考用书

1. 王之一，解剖学基础（第4版），人民卫生出版社。
2. 贾丽萍、王冬梅，基础护理（第4版），人民卫生出版社。